



内服抗がん薬の服用状況：□良 □不良 (飲み忘れ回数 回 その他：)

症状に関する情報

有害事象	CTCAE グレード	評価内容
食欲不振		① 食事摂取量 割 (抗がん剤開始前と比較) ② 一番ひどかったときの程度：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ③ ふだんの生活の妨げ：なし、 少し、 ある程度、 かなり、 ものすごく ④ 体重減少 (現在のクール開始日より- kg)
悪心 (吐き気)		① 吐き気の頻度：なし、 ほとんどなかった、 ときどき、 頻繁、 ほとんどいつも ② 一番ひどかったときの程度：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い
嘔吐		① 嘔吐の頻度：なし、 1日1~2回、 1日3~5回、 1日6回以上 ② 支持療法 □ 吐き気止めの服用を指示した □ 吐き気止めの服用について再度説明した
口の中や喉の痛み		① 一番ひどかったときの程度：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ② ふだんの生活の妨げ：なし、 少し、 ある程度、 かなり、 ものすごく ③ 支持療法 □ なし □ あり (内容：)
下痢		① 下痢の頻度：なし、 ほとんどなかった、 ときどき、 頻繁に、 ほとんどいつも ② 一番多かった時： 回/日 プリストルスケール： ③ ロペラミド内服頻度： 回/日 残数： 錠・カプセル ④ 支持療法 : □ 下痢止めの服用を指示した □ 下痢止めの服用について再度説明した
全身倦怠感 (だるさ)		① 一番ひどい時の程度：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ② ふだんの生活の妨げ：なし、 少し、 ある程度、 かなり、 ものすごく
皮膚症状 (手足症候群、皮疹など)		① 皮膚の痒みの一番ひどかった時：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ② 手足症候群(ひび割れ、皮がむける、赤くなる、痛み)：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ③ 支持療法 □ 軟膏の塗布を指示した □ 軟膏の適正使用について再度説明した
末梢神経障害 (手足の痺れやピリピリ感)		① 一番ひどい時の強さ：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ② ふだんの生活の妨げ：なし、 少し、 ある程度、 かなり、 ものすごく
咳・息切れ		① 咳のひどさ：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い ② ふだんの生活の妨げ：なし、 少し、 ある程度、 かなり、 ものすごく
筋力低下(力が入りにくい)		① 症状の強さ：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い
口渇 (多飲)		① 症状の強さ：なし、 軽い、 中くらい、 強い、 すごく強い
□便秘：(有・無) □流涙：(有・無) □浮腫(有・無) □味覚異常：(有・無) □発熱：(有・無)		

その他の症状